

50 ans ou plus?

Gardez la cadence et renseignez-vous sur

PREVNAR 13

Ne laissez pas le risque de
**PNEUMONIE À
PNEUMOCOQUE**
vous arrêter.



- Cette maladie peut être grave.
- Le risque augmente après l'âge de 50 ans.

Prevnar^{MD} 13 ne prévient que les maladies causées par les types de la bactérie *Streptococcus pneumoniae* présents dans le vaccin, et il ne réduit pas les complications liées aux pneumocoques, comme l'hospitalisation.

Prevnar.ca



Prevnar 13

Le risque augmente **avec l'âge,**

50+

**car votre système
immunitaire s'affaiblit
naturellement à mesure
que vous vieillissez.**

Le risque augmente également
si vous avez 18 ans ou plus

18+

**et présentez un
FACTEUR DE RISQUE**

FACTEURS DE RISQUE

Problèmes de santé

- Maladie des poumons chronique (incluant l'asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique)
- Maladie du cœur chronique
- Maladie du foie chronique
- Immunosuppression (p. ex., greffes, VIH)
- Diabète
- Cancer
- Certaines affections neurologiques

Facteurs liés au mode de vie

- Tabagisme
- Alcoolisme
- Vie en établissement de soins de longue durée

Prevnar 13 ne doit pas être administré aux personnes allergiques (hypersensibles) aux substances actives, à tout autre ingrédient du produit ou à tout autre vaccin qui contient l'anatoxine diphtérique.

Faites particulièrement attention avec Prevnar 13 :

- si vous avez ou avez eu des problèmes médicaux après avoir reçu une dose de Prevnar 13;
- si vous avez une forte fièvre;
- si vous avez un trouble de la coagulation.

Comme tous les vaccins, Prevnar 13 ne protège pas toutes les personnes qui le reçoivent.

Sa transmission est **imprévisible**


La bactérie *Streptococcus pneumoniae*, qui cause la pneumonie à pneumocoque, peut être présente dans votre organisme sans causer de symptômes.

Même si vous ne manifestez aucun symptôme, vous pouvez infecter d'autres personnes.

Comme le virus de la grippe, la bactérie peut être transmise d'une personne à une autre lorsque la personne infectée :



parle




tousse



éternue


La pneumococcie peut être **GRAVE**.

La **pneumococcie** est une infection causée par la bactérie *Streptococcus pneumoniae*, comme :




LA PNEUMONIE

(infection des poumons)



LA PNEUMONIE BACTÉRIÉMIQUE

(infection des poumons accompagnée de la présence d'une bactérie dans le sang)



LA SEPSIE


(présence de bactéries dans le sang)



LA MÉNINGITE

(inflammation autour du cerveau)

La pneumonie à pneumocoque



- Représente jusqu'à **50 à 80 %** des **pneumococcies** chez les adultes.
- Est la forme la plus courante de **pneumonie** bactérienne.

- Peut **mettre la vie en danger** et nécessiter une **hospitalisation** ou l'**admission dans une unité de soins intensifs**.

Prevnar 13 n'est pas indiqué pour réduire les complications liées aux pneumococcies, comme l'hospitalisation et la mort.

Elle peut être **prévenue** par la **vaccination**

Vous pouvez aussi prévenir la pneumonie à pneumocoque par divers moyens :

- en ayant une bonne hygiène;
- en cessant de fumer;
- en faisant de l'exercice et en ayant une alimentation saine pour que votre système immunitaire demeure robuste.

Prevnar[™] 13

Pour en savoir plus,
visitez le **Prevnar.ca**

DIN : 02335204



Faites-vous vacciner
avec une seule dose*
pour aider à prévenir
la pneumonie à
pneumocoque

Prevnar^{MD} 13

Prevnar 13 aide votre corps à fabriquer ses propres anticorps, ce qui contribue à vous protéger contre des maladies causées par 13 types de la bactérie *Streptococcus pneumoniae*, telles que la pneumonie, la pneumonie bactériémique, la sepsie et la méningite.

Voici les effets secondaires les plus fréquents, soit ceux qui ont été observés chez au moins 1 adulte sur 10 : perte d'appétit; maux de tête; diarrhée; éruption; apparition/aggravation de douleurs articulaires; apparition/aggravation de douleurs musculaires; frissons; fatigue; douleur, sensibilité, rougeur, enflure ou durcissement quelconques au point de vaccination; douleur ou sensibilité au point d'injection qui gêne les mouvements du bras. Les effets secondaires fréquents, observés chez au moins 1 adulte sur 100, mais chez moins de 1 adulte sur 10, sont les vomissements (chez les adultes âgés de 50 ans ou plus) et la fièvre.

* La nécessité d'administrer une dose de rappel de Prevnar 13 n'a pas été établie.



Date de la vaccination :



• JE L'AI FAIT! •

50 ans ou plus?

Votre risque de pneumonie
à pneumocoque a augmenté –
et cette maladie peut être grave.



**PENSEZ
PRÉVENTION
PENSEZ À
PREVNAR 13**

Pour en savoir plus, visitez le Prevnar.ca
DIN : 02335204



PREVNAR^{MD} 13, Wyeth LLC, Pfizer Canada SRI, licencié
© 2021 Pfizer Canada SRI, Kirkland (Québec) H9J 2M5

Prevnar^{MD} 13



PP-PNA-CAN-0236-FR