

Votre probabilité de développer le zona



Soyez conscients des probabilités

SHINGRIX n'est pas indiqué pour le traitement du zona ou de ses complications.

SHINGRIX aide à protéger les adultes contre le zona.
SHINGRIX peut être administré aux :

- adultes âgés de 50 ans et plus;
- adultes de 18 ans et plus qui sont ou seront exposés à un risque accru de zona en raison d'une immunodéficience ou d'une immunosuppression causée par une maladie connue ou un traitement.

**OFFREZ-VOUS UNE PROTECTION
CONTRE LE ZONA.
PARLEZ À VOTRE PROFESSIONNEL
DE LA SANTÉ DE**



SHINGRIX

Vaccin contre le zona (non vivant,
recombinant, avec AS01_B comme adjuvant)

**Comme c'est le cas pour tout vaccin, une protection
totale ne peut être garantie.**



À propos du zona

Qu'est-ce qui cause le zona?

Le zona est causé par le même virus que celui qui est à l'origine de la varicelle. Une fois que vous avez eu la varicelle, le virus reste dans votre corps. Parfois, le virus peut redevenir actif et causer le zona. Si vous faites partie des 9 Canadiens sur 10 qui ont déjà eu la varicelle, vous présentez un risque de développer le zona.

Quels sont les symptômes du zona?

Le zona entraîne une éruption cutanée douloureuse pouvant durer plusieurs semaines.

- La douleur provoquée par le zona peut être intense et invalidante. Elle peut nuire aux activités quotidiennes normales, y compris la marche, le sommeil et les activités sociales.

Le zona peut causer d'autres symptômes, comme les suivants :

- Sensation de brûlure, engourdissements ou picotements
- Fièvre
- Céphalées
- Sensibilité au toucher

Le zona peut-il causer d'autres problèmes de santé?

Le zona peut entraîner une douleur nerveuse de longue durée appelée névralgie postzostérienne ou NPZ, qui peut durer des mois, voire des années*.

Voici d'autres problèmes de santé que le zona peut causer :

- Cicatrices
- Troubles de la vue
- Perte d'audition
- Détresse émotionnelle causée par la douleur
- Infection bactérienne de la peau
- Faiblesse
- Paralysie des muscles du visage ou d'autres muscles
- Décès

* SHINGRIX n'est pas indiqué pour le traitement du zona ou de la névralgie postzostérienne.

À quoi ressemble une éruption de zona?



L'éruption cutanée couvre une zone précise de la peau qui peut se trouver n'importe où sur le corps



L'éruption cutanée se caractérise par des vésicules douloureuses

**Votre probabilité de développer
le zona est de**

1 sur 3*

*Chez les adultes qui ont déjà eu la varicelle.

Cette présentation fournit des renseignements sur la maladie et pourrait ne pas refléter les bienfaits du produit.

Présentez-vous un risque de développer le zona?

Si vous avez eu la varicelle, vous présentez un risque de développer le zona.

La varicelle est une maladie infantile courante. Vous l'avez peut-être déjà eu sans vous en souvenir!

Votre probabilité de développer le zona peut être plus élevée si vous présentez certains facteurs de risque, notamment les suivants :

50+ Âge plus avancé (50 ans et plus)

À mesure que vous vieillissez, votre système immunitaire vieillit également et peut avoir plus de difficultés à lutter contre les infections.



Certains problèmes de santé

- Maladie pulmonaire, comme l'asthme ou la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC)
- Maladie rénale
- Diabète
- Infection par le VIH/SIDA
- Cancer



Autres facteurs de risque

Le risque de développer le zona peut varier chez les personnes atteintes d'une maladie sous-jacente ou suivant certains traitements (c.-à-d. des traitements immunosuppresseurs).

> Si vous faites partie des 9 Canadiens sur 10 qui ont déjà eu la varicelle, vous présentez un risque de développer le zona.



VOICI LE ZONA.

**« La douleur élance et donne
une sensation de brûlure. »**

**« C'est une douleur fulgurante,
en coup de poignard. »**

SHINGRIX n'est pas indiqué pour le traitement
du zona ou de la névralgie postzostérienne.



SHINGRIX peut aider à prévenir le zona

Comment fonctionne-t-il?

SHINGRIX est un vaccin qui aide à protéger les adultes contre le zona.

SHINGRIX s'est révélé efficace dans plus de 90 % des cas pour prévenir le zona chez les personnes de 50 ans ou plus. Il a également provoqué une réponse immunitaire chez les personnes de 18 ans et plus dont le système immunitaire était affaibli.

Si vous avez eu la varicelle, votre probabilité de développer le zona est de **1 sur 3**. Si vous présentez des facteurs de risque, comme un âge plus avancé ou certains problèmes de santé et traitements, votre probabilité peut aussi augmenter.

SHINGRIX **ne provoque pas** l'apparition du zona. SHINGRIX est un vaccin non vivant et recombinant; il ne peut causer la maladie pour la prévention de laquelle il a été conçu.

Comme n'importe quel autre vaccin, SHINGRIX pourrait ne pas conférer une protection complète à toutes les personnes vaccinées.

 **Protégez-vous grâce
à SHINGRIX.**

Le vaccin SHINGRIX

Vous recevrez deux doses de SHINGRIX à un intervalle de 2 à 6 mois

Selon votre état de santé ou les traitements planifiés, votre médecin pourrait recommander que la deuxième dose vous soit administrée 1 mois après la première.

Au moment où vous recevrez votre première dose, demandez à votre professionnel de la santé de fixer un rendez-vous pour l'administration de votre deuxième dose.



6 mois

.....



**> Pour maximiser la protection
conférée par SHINGRIX,
assurez-vous de recevoir
les deux doses.**



FAQ

Qu'est-ce que SHINGRIX?

SHINGRIX est un vaccin non vivant qui aide à protéger les adultes contre le zona. Le vaccin SHINGRIX ne contient aucun virus vivant.

SHINGRIX est-il remboursé par les régimes provinciaux d'assurance-maladie?

Chaque gouvernement provincial décide quels vaccins sont offerts gratuitement aux personnes admissibles. Communiquez avec les autorités de la santé publique pour en savoir plus.

Combien coûte SHINGRIX?

Le coût de SHINGRIX varie d'une pharmacie à l'autre ou d'une clinique à l'autre. Vérifiez auprès de votre pharmacie ou de votre clinique pour connaître le prix. SHINGRIX est couvert par la plupart des régimes privés d'assurance-maladie. Vous pouvez communiquer avec votre compagnie d'assurance pour obtenir plus d'information au sujet de votre couverture et lui donner le DIN (numéro d'identification du médicament) de SHINGRIX: 02468425.

SHINGRIX protège-t-il contre la varicelle?

Non, SHINGRIX est utilisé uniquement pour aider à prévenir le zona chez les adultes de 50 ans ou plus et chez les adultes de 18 ans et plus qui sont ou seront exposés à un risque accru de zona en raison d'un système immunitaire affaibli à cause d'une maladie connue ou d'un traitement.

SHINGRIX peut-il être administré en même temps qu'un autre vaccin?

SHINGRIX peut être administré en même temps que le vaccin sans adjuvant contre la grippe saisonnière, le vaccin antipneumococcique 23-valent (VPP23) et le vaccin dcaT*. Les vaccins doivent être administrés à des points d'injection différents sur votre corps. Si SHINGRIX est administré en même temps que le vaccin polysaccharidique 23-valent contre le pneumocoque, vous pourriez être plus susceptible de ressentir de la fièvre ou des frissons.

* Vaccin dcaT: vaccin associé contre la diphtérie, la coqueluche (acellulaire) et le tétanos.

Outils à votre intention

Numérisez ce code QR ou visitez le site **SHINGRIX.ca** pour obtenir d'autres ressources sur SHINGRIX, y compris:



Des renseignements sur le zona et SHINGRIX



Des options de rappel de votre prochaine dose



Courriel



Ajout automatique dans votre calendrier



SHINGRIX à la télé

**N'oubliez pas que vous devrez
recevoir 2 doses de SHINGRIX
pour maximiser votre protection
contre le zona.**

Apposez ces autocollants sur votre calendrier
pour retenir vos dates de vaccination par SHINGRIX.



Trouvez-nous sur Facebook pour recevoir
des mises à jour et des renseignements
sur le zona et SHINGRIX.

facebook.com/SHINGRIXCA

**> Obtenez plus de renseignements,
d'outils et de ressources en
visitant SHINGRIX.ca.**



Effets secondaires de SHINGRIX

Comme tout autre médicament, SHINGRIX peut causer des effets secondaires, bien que ceux-ci ne surviennent pas chez tous les patients. La majorité des effets secondaires sont jugés d'intensité légère à modérée et ne durent pas plus de 3 jours.

Effets indésirables **très courants**
(fréquence supérieure à 1 dose de vaccin sur 10) :

Réactions au point d'injection

- Douleur
- Rougeur
- Enflure

Réactions générales

- Mal de tête
- Maux gastriques et digestifs (y compris nausées, vomissements, diarrhée ou douleur à l'estomac)
- Douleur musculaire
- Fatigue
- Frissons, fièvre

Effets indésirables **courants**
(fréquence atteignant 1 dose de vaccin sur 10) :

- Démangeaisons au point d'injection
- État de malaise général

Effets indésirables **peu courants**
(fréquence atteignant 1 dose de vaccin sur 100) :

- Douleurs articulaires (arthralgie)

Lorsque vous recevez SHINGRIX, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessus. En cas d'aggravation d'un de ces effets secondaires ou si vous présentez un effet secondaire qui n'est pas mentionné dans ce document, communiquez avec votre médecin.

**Parlez de SHINGRIX à votre
professionnel de la santé.**

Offrez-vous une protection contre le zona avec SHINGRIX



**Numérisez ce code
QR pour trouver
une clinique de
vaccination près
de chez vous**

SHINGRIX est un vaccin qui aide à protéger les adultes contre le zona. SHINGRIX peut être administré aux adultes de 50 ans et plus ou aux adultes de 18 ans et plus qui sont ou seront exposés à un risque accru de zona en raison d'une immunodéficience ou d'une immunosuppression causée par une maladie connue ou un traitement. Une protection totale n'est pas garantie. SHINGRIX n'est pas indiqué pour la prévention de la varicelle ni pour le traitement du zona ou de ses complications. SHINGRIX ne doit pas être utilisé si vous êtes allergique à tout ingrédient entrant dans sa composition. Des effets indésirables peuvent survenir. Les effets indésirables très courants (> 10 % des doses) signalés dans les essais cliniques étaient les suivants: douleur, rougeur et enflure au point d'injection, mal de tête, maux gastriques et digestifs, douleur musculaire, fatigue, frissons et fièvre. La majorité des effets indésirables ont été d'intensité légère ou modérée et ont duré moins de 3 jours. Demandez à votre professionnel de la santé si SHINGRIX vous convient. On peut trouver des renseignements complets sur le produit à l'adresse <http://gsk.ca/shingrix/fr>. Pour signaler un effet indésirable, veuillez composer le 1-800-387-7374.

Votre régime d'assurance privé peut rembourser le coût de SHINGRIX. Pour vérifier cette information, communiquez avec votre assureur et donnez-lui le DIN (numéro d'identification du médicament) de SHINGRIX : 02468425.

Les marques de commerce sont détenues
ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.
©2025 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

504608
03/25



Vaccin contre le zona (non vivant,
recombinant, avec AS01_g comme adjuvant)