



# APPRENEZ-EN PLUS SUR AREXVY

## Qu'est-ce qu'**AREXVY**?

AREXVY est un vaccin indiqué pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les adultes de 60 ans et plus.

**AREXVY** 

VACCIN CONTRE LE VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL  
(RECOMBINANT, AVEC AS01<sub>e</sub> COMME ADJUVANT)

**AREXVY** 

VACCIN CONTRE LE VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL  
(RECOMBINANT, AVEC AS01<sub>e</sub> COMME ADJUVANT)

# QU'EST-CE QUE LE VRS?

Le VRS est un virus courant et très contagieux qui peut causer des infections dans les poumons et les voies respiratoires.

## Qui est exposé à des risques?

L'infection par le VRS, bien qu'elle puisse se manifester à tout âge et qu'elle provoque généralement des symptômes légers, semblables à ceux d'un rhume, peut également causer des maladies respiratoires plus graves ou encore aggraver certaines maladies et affections existantes chez les adultes âgés.

## Pourquoi devrais-je m'inquiéter du VRS?

**Les personnes exposées à un risque accru de conséquences graves du VRS sont les suivantes :**

- Adultes âgés
- Adultes qui présentent des affections chroniques sous-jacentes comme l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), les maladies cardiaques, le diabète et les maladies du foie ou du rein de stade avancé
- Adultes dont le système immunitaire est affaibli

Les adultes âgés sont exposés à un risque accru de conséquences graves du VRS parce que le système immunitaire s'affaiblit avec l'âge, ce qui rend plus difficile pour le corps de lutter contre les infections.

Les conséquences graves du VRS peuvent inclure la pneumonie, l'apparition ou l'aggravation de maladies chroniques sous-jacentes (comme l'asthme, la MPOC, l'insuffisance cardiaque congestive), la crise cardiaque et l'accident vasculaire cérébral pouvant entraîner l'hospitalisation, voire la mort.

Parlez à votre professionnel de la santé pour savoir si vous présentez un risque d'infection par le VRS.

## À quel moment a lieu la saison du VRS?

L'infection par le VRS peut se produire à tout moment de l'année. Elle suit une tendance saisonnière et, au Canada, une vague d'activité accrue (appelée épidémie) se produit habituellement de la fin de l'automne au début du printemps.

## Qui est admissible au vaccin?

Les adultes de 60 ans et plus peuvent être admissibles au vaccin AREXVY.



## COMMENT AREXVY AGIT-IL?

AREXVY aide le corps à produire des anticorps et des globules blancs pour réduire considérablement le risque de contracter des infections des voies respiratoires inférieures causées par les sous-types A et B du VRS chez les adultes âgés de 60 ans et plus.

Comme AREXVY ne contient pas le virus respiratoire syncytial, il ne peut pas causer d'infection.

Comme n'importe quel autre vaccin, AREXVY pourrait ne pas conférer une protection complète à toutes les personnes vaccinées.

### Comment prendre AREXVY

- AREXVY est administré en une seule injection de 0,5 mL dans un muscle (généralement dans la partie supérieure du bras).
- AREXVY peut être administré en même temps qu'un vaccin inactivé contre la grippe saisonnière.
- Si AREXVY est administré en même temps qu'un autre vaccin, les vaccins doivent être administrés à des sites d'injection différents.

Planifiez votre vaccination par **AREXVY** dès aujourd'hui.

# EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

Comme tout autre médicament, AREXVY peut causer des effets secondaires, bien que ceux-ci ne surviennent pas chez tous les patients.

Les effets secondaires suivants pourraient survenir après l'administration d'AREXVY. La majorité des effets secondaires sont d'intensité légère ou modérée et ne durent pas longtemps (habituellement 1 ou 2 jours). Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez AREXVY.

## Très courants

(pourraient se manifester avec plus de 1 dose de vaccin sur 10):



Douleur au point d'injection



Maux de tête



Fatigue



Douleurs musculaires (myalgie) et articulaires (arthralgie)

## Courants

(pourraient se manifester avec jusqu'à 1 dose sur 10 du vaccin):

- Rougeur et enflure au point d'injection, fièvre, frissons
- Nez qui coule (rhinorrhée)

## Peu courants

(pourraient se manifester avec jusqu'à 1 dose sur 100 du vaccin):

- Démangeaisons (prurit) au site d'injection, douleur, état de malaise général
- Enflure des ganglions lymphatiques (lymphadénopathie)
- Réactions allergiques, telles que des éruptions cutanées
- Maux de cœur (nausées), maux d'estomac

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.



**AREXVY** 

VACCIN CONTRE LE VIRUS RESPIRATOIRE SYNCYTIAL  
(RECOMBINANT, AVEC AS01<sub>E</sub> COMME ADJUVANT)

# RENSEIGNEMENTS IMPORTANTES SUR AREXVY

## Qui ne devrait pas recevoir AREXVY?

Ne pas utiliser AREXVY si vous êtes allergique à tout ingrédient entrant dans la composition d'AREXVY. Les signes d'une réaction allergique peuvent comporter une éruption cutanée accompagnée de démangeaisons, un essoufflement et une enflure du visage ou de la langue.

## Que dois-je dire à mon professionnel de la santé avant de recevoir AREXVY?

**Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :**

- si vous présentez une infection sévère et une température élevée.  
Dans ces cas, la vaccination pourrait être retardée jusqu'à votre guérison. Une légère infection, tel un rhume, ne devrait pas poser de problème, mais parlez-en d'abord à votre professionnel de la santé.
- si vous avez un problème de saignement ou si vous avez des bleus facilement.
- si vous vous êtes évanoui lors d'une précédente injection ou avant toute autre injection.

## Quelles autres mises en garde dois-je connaître?

- Abstenez-vous de conduire un véhicule ou de faire fonctionner une machine si vous ne vous sentez pas bien.
- AREXVY n'est pas indiqué chez les nourrissons, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans.
- AREXVY n'est pas recommandé chez les femmes enceintes ou qui allaitent.



## VOUS AVEZ BESOIN DE PLUS D'INFORMATION?

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la section Renseignements destinés aux patients à l'adresse [gsk.ca/arexvy/fr](https://gsk.ca/arexvy/fr).



Les marques de commerce sont détenues ou utilisées sous licence par le groupe de sociétés GSK.  
©2023 Groupe de sociétés GSK ou son concédant de licence.

