



**FLUAD<sup>®</sup>**

Vaccin antigrippal (inactivé, à antigènes de surface, contenant l'adjuvant MF59<sup>MD</sup>)

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AU  
**PATIENT**

**FLUAD<sup>MD</sup> procure une immunisation active chez les adultes de 65 ans et plus.**



Pour en savoir plus, visitez [fluad.ca](http://fluad.ca)!

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre FLUAD<sup>MD</sup>. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce vaccin. Pour toute question au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou votre pharmacien.

## À quoi sert FLUAD<sup>MD</sup> ?

FLUAD<sup>MD</sup> est un vaccin antigrippal inactivé indiqué chez l'adulte âgé d'au moins 65 ans pour le protéger contre la grippe causée par les virus de l'influenza des sous-types A et B.

## Comment FLUAD<sup>MD</sup> agit-il ?

- FLUAD<sup>MD</sup> déclenche la production par l'organisme d'anticorps dirigés contre le virus, comme le font les autres vaccins antigrippaux.
- Ainsi, lorsque votre organisme est exposé au virus de la grippe, il est en mesure de se défendre. Les anticorps freinent l'attaque du virus.
- Le vaccin ne peut pas donner la grippe, car il ne contient que des portions de virus, et non le virus vivant complet.
- Après la vaccination, il faut de 2 à 3 semaines à votre corps pour développer des anticorps.
  - Par conséquent, si vous êtes exposé au virus de l'influenza immédiatement avant ou après avoir reçu le vaccin, vous pouvez contracter la maladie.
- Le vaccin n'offre pas de protection contre le rhume, même si certains des symptômes du rhume sont semblables à ceux de la grippe.
- Les virus de l'influenza changent constamment, et c'est pourquoi de nouveaux vaccins sont produits chaque année. Pour maintenir une protection contre la grippe, il faut se faire vacciner chaque année avant l'arrivée de la saison hivernale.

Il est particulièrement important pour certains groupes de personnes de se faire vacciner. Mentionnons notamment les personnes atteintes de certains troubles médicaux, les personnes âgées de 65 ans et plus et celles qui prennent certains médicaments. Si vous ne savez pas si vous devez ou non vous faire vacciner, parlez-en à votre professionnel de la santé.

FLUAD<sup>MD</sup> est un produit standardisé selon les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) pour la saison de 2020-2021 dans l'hémisphère Nord.

FLUAD<sup>MD</sup> ne contient pas de thimérosal ni d'autre agent de conservation.

Le piston de la seringue est exempt de latex; FLUAD<sup>MD</sup> est considéré comme sans danger pour les personnes allergiques au latex.

## N'utilisez pas FLUAD<sup>MD</sup> si vous:

- avez des antécédents d'hypersensibilité aux protéines d'œufs, à d'autres composants du vaccin; et que vous
- avez des antécédents de réaction menaçant le pronostic vital après l'administration d'un vaccin antigrippal.

Si le syndrome de Guillain-Barré s'est développé dans les 6 semaines suivant l'administration d'un vaccin antigrippal antérieur, la décision d'administrer FLUAD<sup>MD</sup> doit être prise après avoir envisagé rigoureusement les avantages et les risques potentiels.

Chez les personnes immunodéprimées, la réponse immunitaire à FLUAD<sup>MD</sup> pourrait être diminuée.

### Autres mises en garde à connaître:

**Consultez votre médecin ou votre pharmacien AVANT d'utiliser FLUAD<sup>MD</sup> si:**

- vous ou votre enfant êtes allergique aux œufs ou aux produits dérivés des œufs;
- vous ou votre enfant êtes allergique à l'une de ces substances: kanamycine et sulfate de néomycine, hydrocortisone, formaldéhyde, bromure d'hexadécyltriméthylammonium ou polysorbate 80;
- vous ou votre enfant faites de la fièvre ou vous pensez être févreux;
- vous ou votre enfant avez déjà eu une réaction grave à un vaccin antigrippal dans le passé;
- vous ou votre enfant avez des allergies connues;
- vous ou votre enfant éprouvez des problèmes de santé;
- vous êtes enceinte, demandez conseil à votre médecin;
- vous ou votre enfant prenez actuellement des médicaments (immunosuppresseur, théophylline, anticoagulant tel que la warfarine).



FLUAD<sup>MD</sup> ne peut pas être administré en même temps que d'autres vaccins.

Comme il en est pour tous les vaccins, il se peut que FLUAD<sup>MD</sup> ne protège pas 100% des personnes vaccinées contre la grippe.

La réponse immunitaire à FLUAD<sup>MD</sup> peut être diminuée durant le traitement immunosuppresseur.

### POPULATIONS PARTICULIÈRES

- L'efficacité et l'innocuité de FLUAD<sup>MD</sup> chez la femme enceinte ni chez celle qui allaite n'ont pas été établies.

Il n'existe aucune interaction connue entre FLUAD<sup>MD</sup> et d'autres vaccins ou médicaments.

FLUAD<sup>®</sup>

## Comment utiliser FLUAD<sup>MD</sup>:

L'administration de FLUAD<sup>MD</sup> se fait par injection dans un muscle.

### Dose habituelle:

- Adultes d'au moins 65 ans: dose unique de 0,5 mL.

Comme pour tous les vaccins injectables, une supervision médicale et un traitement médical appropriés doivent toujours être immédiatement disponibles pour les cas rares où se produirait un choc anaphylactique après l'administration du vaccin.

Si vous croyez avoir reçu une trop grande quantité de FLUAD<sup>MD</sup>, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé, le service d'urgence d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même si vous n'éprouvez aucun symptôme.



## Quels sont certains des effets secondaires qui pourraient être associés à l'utilisation de FLUAD<sup>MD</sup> ?

Il peut arriver chez certaines personnes que les vaccins antigrippaux provoquent des effets secondaires.

Les plus fréquents sont:

- fièvre
- sentiment d'inconfort
- frissons
- fatigue
- maux de tête
- transpiration
- douleur aux muscles ou aux articulations
- chaleur

Les réactions cutanées comprennent la rougeur, l'enflure, la douleur, l'ecchymose (un bleu) et un durcissement de la peau au point d'injection et des démangeaisons. Ces réactions disparaissent normalement sans traitement après une journée ou deux.



## Déclaration des effets indésirables soupçonnés

**Pour le grand public:** Si vous ressentez un effet secondaire à la suite d'une vaccination, veuillez le signaler à votre médecin, à votre infirmière ou à votre pharmacien.

Si vous souhaitez obtenir des informations sur l'atténuation des effets secondaires, veuillez contacter votre professionnel de la santé. L'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Santé Canada et Seqirus UK Limited ne peuvent pas fournir de conseils médicaux.

### Pour en savoir plus sur FLUAD<sup>MD</sup>:

- Communiquez avec votre professionnel de la santé
- Consultez la monographie de produit intégrale, rédigée à l'intention des professionnels de la santé. Elle renferme également les Renseignements destinés aux patients. Vous pouvez l'obtenir sur le site Web de Santé Canada ou du fabricant ([www.seqirus.ca](http://www.seqirus.ca)), ou en composant le 1-855-358-8966.
- Visitez [fluad.ca](http://fluad.ca)

Le numéro d'identification du médicament (DIN) de FLUAD<sup>MD</sup> est le 02362384. Votre compagnie d'assurance pourrait vous demander ce numéro.

**FLUAD**<sup>®</sup>





Pour en savoir plus sur FLUAD<sup>MD</sup> :  
Visitez [fluad.ca](http://fluad.ca)

FLUAD<sup>MD</sup> procure une immunisation active  
chez les adultes de 65 ans et plus.



**F L U A D**<sup>®</sup>

Vaccin antigrippal (inactivé, à antigènes  
de surface, contenant l'adjuvant MF59<sup>MD</sup>)