

LA RAGE :

ÊTES-VOUS À RISQUE ?

CERTAINS RISQUES SONT PLUS ÉVIDENTS QUE D'AUTRES

**PENSEZ À VOUS FAIRE VACCINER. PARLEZ-EN
À VOTRE PROFESSIONNEL DE LA SANTÉ.**



RABAVERT^{MD} EST INDIQUÉ AUX FINS :

- d'immunisation contre la rage avant exposition, dans le cadre d'une primovaccination ou d'une vaccination de rappel, chez tous les groupes d'âge;
- de prophylaxie contre la rage après exposition chez tous les groupes d'âge.



RabAvert^{MD}

Vaccin antirabique

QU'EST-CE QUE LA RAGE ?

La rage est une infection virale rare d'origine animale qui peut être transmise à l'humain. Elle est causée par un virus de la famille des *Rhabdoviridæ*, qui attaque le système nerveux central et finit par toucher le cerveau.

Le virus se trouve généralement dans la salive d'un animal infecté.

LA RAGE EST PRESQUE TOUJOURS MORTELLE UNE FOIS QUE SES SYMPTÔMES SE MANIFESTENT.

La rage est une maladie mortelle transmise à l'être humain par la salive d'un animal infecté à la suite :

- **D'UNE MORSURE;**
- **DU LÉCHAGE D'UNE ÉGRATIGNURE OU D'UNE LÉSION CUTANÉE;**
- **DU LÉCHAGE DES MUQUEUSES (DES YEUX, DE LA BOUCHE, ETC.)**

Étant donné que la rage est presque toujours mortelle une fois que ses symptômes se manifestent, une personne exposée au virus doit être traitée le plus tôt possible. L'immunisation contre la rage avant exposition et la prophylaxie après exposition stimulent la production par le corps d'anticorps neutralisants, qui offrent une protection contre le virus de la rage.

AU CANADA, LES ANIMAUX QUI TRANSMETTENT LE PLUS SOUVENT LA RAGE SONT :




les chauves-souris,

les mouffettes,

les rats laveurs



et les renards.



SI VOUS TROUVEZ UNE CHAUVESOURIS DANS VOTRE MAISON OU VOTRE CHALET, SACHEZ QUE...

- Plus de la moitié des cas de rage signalés au Canada au cours des deux dernières années étaient attribuables à cet animal.
- Une prophylaxie après exposition au virus de la rage doit être envisagée en cas de contact direct avec une chauve-souris et lorsqu'on ne peut exclure la possibilité de morsures, de griffures ou d'exposition à la salive dans une plaie ou une muqueuse.

SUIS-JE À RISQUE ?

Vous êtes à risque de contracter la rage si vous êtes en contact avec des animaux potentiellement enrégés.

- Personnel de laboratoire, vétérinaires
- Agents de contrôle des animaux, préposés aux animaux, travailleurs de la faune
- Explorateurs de grottes (spéléologues)
- Chasseurs et trappeurs dans des zones où des cas de rage ont été confirmés
- Toute personne qui, par ses activités, a des contacts fréquents avec le virus de la rage ou avec des chauves-souris, des ratons laveurs, des mouffettes, des chats ou des chiens enrégés
- Tout enfant qui ne comprendrait pas la nécessité de se tenir à l'écart des animaux ou de signaler une morsure




VOUS ÊTES À RISQUE SI VOUS VOYAGEZ OU PLANIFIEZ DE VOYAGER DANS UNE ZONE FORTEMENT ENDÉMIQUE

Chez les voyageurs, le risque varie en fonction de l'itinéraire, de l'objet et de la durée du voyage, de même que des activités et de l'accès à des soins médicaux. Les voyageurs qui doivent se rendre dans des zones d'endémie où l'accès à des traitements post-exposition sûrs et adéquats est difficile, de même que ceux qui se rendent fréquemment ou effectuent des séjours prolongés dans des régions à haut risque, devraient sérieusement envisager de se faire vacciner contre la rage avant leur départ.

- **La rage est présente sur tous les continents, sauf l'Antarctique.**
- **Vous voyagez en Thaïlande, au Brésil, en Chine, au Vietnam, en Inde, à Cuba, au Mexique, en Afrique du Sud ou en Asie ?**
- **Il ne s'agit là que de quelques-unes des régions où les cas de rage demeurent répandus.**

CAS DE RAGE



D'après l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), 2013.

ÉVALUER VOTRE RISQUE


Il est fortement recommandé de communiquer avec une clinique de santé-voyage, un pharmacien ou un médecin au moins **6 semaines avant votre départ**.

Selon l'évaluation de votre risque individuel, un professionnel de la santé peut établir si vous avez besoin de vaccins ou de médicaments préventifs et vous conseiller sur les précautions à prendre pour éviter les maladies.

PRENDRE RABAVERT^{MD}



Aux fins de l'immunisation avant exposition, la primovaccination comprend trois injections.



UNE DOSE DE RAPPEL EST OFFERTE
À LA SUITE DU TRAITEMENT
COMPLET PAR RABAVERT^{MD}

UNE ÉTUDE SUR LES CAS DE RAGE LIÉS AU VOYAGE A RÉVÉLÉ QUE LES PRINCIPAUX ANIMAUX PORTEURS ÉTAIENT :

57%
CHIENS



11%
CHATS

26%
SINGES



Si vous planifiez un voyage, consultez votre professionnel de la santé au sujet des risques de rage et de RabAvert^{MD}, un vaccin employé pour prévenir la rage depuis plus de 15 ans au Canada.

À QUI S'ADRESSER ?



Médecin



Spécialiste en
santé-voyage



Pharmacien



Personnel
infirmier

RECOMMANDÉ PAR LE COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL DE L'IMMUNISATION (CCNI)

Le CCNI, un comité d'experts canadiens chargé de formuler des recommandations sur l'emploi des vaccins, conseille aux personnes qui présentent un risque élevé et soutenu d'exposition à la rage de recevoir :

- le vaccin contre la rage; et
- un vaccin de rappel, au besoin.

Consultez votre professionnel de la santé au sujet de RabAvert^{MD}.

BÉNÉFICIEZ-VOUS D'UNE COUVERTURE D'ASSURANCE?

Il est possible que le vaccin RabAvert^{MD} soit remboursé par votre assurance privée. Pour le savoir, veuillez communiquer avec votre compagnie d'assurance privée et donner le DIN (numéro d'identification du médicament) ci-dessous.

DIN de RabAvert^{MD} : 02267667

Bien que le profil d'innocuité et de tolérabilité de RabAvert^{MD} soit bien établi, des effets indésirables peuvent survenir, les plus courants étant des réactions locales telles une enflure et une douleur au point d'injection; ainsi que des symptômes qui ressemblent à ceux de la grippe, comme de la fatigue, de la fièvre, des maux de tête, des étourdissements, une faiblesse et une éruption cutanée. Les effets indésirables courants sont une rougeur au point d'injection, une douleur abdominale, un gonflement des ganglions lymphatiques, une douleur musculaire et un malaise général, une douleur articulaire, des nausées, des vomissements, de la diarrhée et une diminution de l'appétit. Des antécédents de réactions anaphylactiques au vaccin ou à l'un des composants du produit ou du contenant constituent une contre-indication à une immunisation avant exposition au moyen de ce vaccin.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les précautions et les contre-indications, veuillez consulter votre médecin ou un professionnel d'une clinique de santé-voyage.

Comme tous les vaccins, RabAvert^{MD} pourrait ne pas conférer une protection complète à toutes les personnes vaccinées.

Si vous êtes exposé à un animal enragé ou potentiellement enragé, il est impératif de nettoyer et de rincer immédiatement et soigneusement la plaie à l'eau et au savon. On doit s'assurer de nettoyer la plaie en profondeur. Pour ce faire, la rincer pendant une quinzaine de minutes. Consultez immédiatement un médecin.

Visitez le site valneva.ca pour obtenir des renseignements complets sur RabAvert^{MD}.

